

Fermente
Saccharomyces
cerevisiae

- Maya hücresi
- Metabolitleri
- Denatüre medium

Fortyest[®]ar 4C LS

Postbiyotik



Fortyeastar 4C LS®

Postbiyotikler: Bağırsak sağlığında yeni bir dönem başlıyor

Depolama

Serin ve kuru bir yerde, güneş ışığına direkt temas etmeyecek şekilde muhafaza ediniz. Kullanılmadığında ambalajı kapalı tutunuz.

Ambalaj

20 kg

Raf Ömrü

18 ay

Exclusive Distribütör:

Dynamic Agriculture Group Tarım ve Hay. San. Dış Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis:

Göztepe Mah. Kartopu Cad. Sıra:64 Göksu Villaları Beykoz İstanbul

Lojistik Center:

Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsu Bulvarı Sıra:53/3A Merkez Torbalı/İZMİR

Tel: +90 216 606 75 18

Faks: +90 216 606 75 18

E-mail: info@dynamicagrigroup.com

dynamicagrigroup.com

Fortyestar 4C LS®


Postbiyotikler:
Bağırsak sağlığında yeni bir dönem başlıyor

Fortyestar 4C LS nedir?

- Özellikle bağırsak sağlığına destek olmak ve immün sistemi desteklemek üzere formalize edilmiş öncü bir postbiyotik çözümdür.
- Kaliteli hammadde içeriğiyle yüksek standartlarda üretilmiş olup GDO içermez.

Neden Fortyestar 4C LS kullanmalıyız?

Benzersiz fonksiyonel metabolitleri meydana getiren, patentli maya SA-10 (*S. cerevisiae*) sıvı ve katı anaerobik fermentasyon proseslerini içeren fermantasyon teknolojisini kullanarak üretilir ve yetiştirildiği ortamda kurutulur.



Fortyestar 4C LS nasıl çalışıyor

Sindirim sisteminde geniş bir etki mekanizmasıyla çalışarak;

- İmmün sistemi dengeler
- Antioksidan etki gösterir
- Prebiyotik aktivitesiyle faydalı bakterileri geliştirir
- Alınan besinlerin sindirimini arttırarak faydalanmayı sağlar

Fortyeastar 4C LS Faydaları

- Rumen sağlığını geliştirir.
- Sıcaklık stresi etkisini hafifletir.
- Erken laktasyonda DMI artırır.
- Daha kolay bir laktasyona hazırlık dönemi sağlar.
- Süt verimini artırır.
- Daha iyi bir süt kalitesi sağlar. (yağ, protein, SCS)

Tavsiye edilen kullanım

Büyükbaş için; hayvan başına, günlük 7-14 gr arasında kullanılması tavsiye edilir.

Sütten kesim öncesi ve sonrası buzağılara hayvan başına 7gr/gün,

Laktasyonda ve laktasyonda olmayan inekler için hayvan başına 14gr/gün kullanım tavsiye edilir.

Koyun, keçi için; Hayvan başına 4gr/gün kullanılması tavsiye edilir.

Kanatlılar için; Etlik piliç; Başlangıç yemine 1 Kg/TM, Büyütme/Bitirme yemine 0,5/TM, Yumurtacı ve damızlık yemleri için; 1 Kg/TM şeklinde kullanılması tavsiye edilir.

Akuakültür (Balık yetiştiriciliği) için; 1 Kg/TM şeklinde kullanılması tavsiye edilir.

Species (# of studies)	Immune Health			Digestive Health				Relevant Outcomes		
	Immune Cell Func.	Immune Cell Pop.	Barrier Integrity	Nutrient Digestibility	Fecal Quality	Fecal Fermentation End - Prods.	Fecal Metabolomics	Growth	Feed Intake	Feed Efficiency
Dairy & Beef (10)	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Poultry (10)	•	•	•	•			•	•	•	•
Aqua (20)	•		•	•				•	•	•

Ürünle ilgili yapılan yabancı kaynaklı çalışmalar ve yayınların detayları için bizimle irtibata geçebilirsiniz!